



07



「地鶏」はふつうの鶏と何が違うのですか？

A

種・育成期間・飼育方法などが異なります。



「地鶏」とは…

- ①素ひなは、在来種（下記に記載の在来種）由来の血液が50パーセント以上のもの
- ②育成期間はふ化日から80日以上のももの
- ③飼育方法は、28日齢以上ひら飼いし、28日齢以降1平方メートル当たり10羽以下で飼育したものを



ひら飼いの様子

をいいます。

地鶏の中には150日間肥育されるものもあります。



ふつうの鶏は「若どり」と呼ばれ、ふ化後48～55日間飼育され、平均体重2.8キログラムで、年間6億数千万羽が出荷されています。

おもな在来種

- ・会津地鶏・伊勢地鶏・岩手地鶏・インギー
- 鶏うごつけい・烏滑鶏うずらちやぼ・鶉矮鶏うすなわひげ・ウタイチェーン・エー
- コクおきなわひげ・黄斑プリマスロックおきなわひげ・沖縄髭地鶏
- 尾長鶏おきなわひげ・河内奴鶏がんにけい・雁鶏がんにけい・岐阜地鶏がんにけい・熊本種
- 九連子鶏くれこ・黒柏鶏くろかし・コーチンこえよし・声良鶏こえよし・薩
- 摩鶏さどひげ・佐渡髭地鶏さどひげ・地頭鶏じとっこ・芝鶏しばも・軍鶏しやも
- 小国鶏しょうこく・矮鶏ちやぼ・東天紅鶏とうまる・蜀鶏とさくきん・土佐九斤
- 土佐地鶏とさくきん・対馬地鶏とさくきん・名古屋種なごやしゅ・比内地鶏ひのち
- 三河種みのひきちやぼ・蓑引矮鶏ものひき・蓑引鶏ものひき・宮地鶏みやち・ロードアイランドレッド



◀さつま地鶏

◎写真 鹿児島県 さつま地鶏生産者協議会



◀比内地鶏

◎写真 (社) 日本食鳥協会



▲名古屋コーチン

◎写真 (独) 家畜改良センター